

SEMINAR ON CONTINUITY IN SEMILATTICES (SCS)

NAME(S) *Morike Kamara (Darmstadt).*

| DATE | M | D | Y |
|-------------|---|----------|-----------|
| <i>July</i> | | <i>1</i> | <i>77</i> |

TOPIC : *Treillis continu et treillis complètement distributifs.*

REFERENCE : *voir à la page 3.*

Dans un treillis continu T on appelle élément copremier, un élément p tel que $p \leq v \vee u$ implique $p \leq u$ ou $p \leq v$. On dit que T admet assez d'éléments copremiers, si tout élément/de T est supremum d'éléments copremiers. Soit I l'intervalle-unité ; on désigne par $(\underline{CL} \cap \underline{SUP})(T, I)$ l'ensemble des morphismes de T dans I préservant les infs et les sups quelconques. T^{OP} dénote le treillis muni de l'ordre opposé de T ; le treillis T est dit bicontinu si T et T^{OP} sont continus.

Il s'agit ci-dessous de démontrer le

Théorème : *Dans un treillis continu T les conditions suivantes sont équivalentes*

- (1) T a assez d'éléments copremiers*
- (2) T est complètement distributif*
- (3) L'ensemble $(\underline{CL} \cap \underline{SUP})(T, I)$ sépare*
- (4) T peut être plongé dans une puissance de I ; ce plongement préserve les sup et les inf quelconques*
- (5) T est bicontinu et T est distributif*
- (6) T^{OP} est continu et T est distributif.*

Démonstration : *(1) \implies (2). Pour un treillis complet T la distributivité complète est équivalente à*

West Germany: TH Darmstadt (Gierz, Keimel)
U. Tübingen (Mislove, Visit.)

England: U. Oxford (Scott)

USA: U. California, Riverside (Stralka)
LSU Baton Rouge (Lawson)
Tulane U., New Orleans (Hofmann, Mislove)
U. Tennessee, Knoxville (Carruth, Crawley)

$\wedge(\vee(a_{ij}/j \in J)/i \in I) = \vee(\wedge(a_{i\varphi_i}/i \in I)/\varphi: I \rightarrow J, \forall a_{ij} \in T, i \in I, j \in J$; mais dans cette égalité une direction est évidente à savoir : le membre de droite est toujours \leq à celui de gauche . Donc la distributivité complète est équivalente à

$\wedge(\vee(a_{ij}/j \in J)/i \in I) \leq \vee(\wedge(a_{i\varphi_i}/i \in I)/\varphi: I \rightarrow J), \forall a_{ij} \in T, i \in I, j \in J$. Soit donc un élément copremier p tel que $p \ll \wedge(\vee(a_{ij}/j \in J)/i \in I)$, cela entraîne que $p \ll \wedge(a_{ij}/j \in J)$ pour tout $i \in I$, ce qui a pour conséquence, d'après la définition de \ll qu'il existe j_1, \dots, j_n tel que $p \leq a_{ij_1} \vee \dots \vee a_{ij_n}$; mais du fait que p est copremier il doit exister un j_k dans $\{j_1, \dots, j_n\}$ tel que $p \leq a_{ij_k}$; posons $j_k =: \varphi_i$. On a donc que pour tout $i \in I$, il existe φ_i et $p \leq a_{i\varphi_i}$, ceci entraîne que $p \leq \wedge(a_{i\varphi_i}/i \in I)$; en étendant à toutes les fonctions de choix $\varphi: I \rightarrow J$ on obtient $p \leq \vee(\wedge(a_{i\varphi_i}/i \in I)/\varphi: I \rightarrow J)$, $\forall a_{ij} \in T, i \in I, j \in J$. Enfin , comme les éléments copremiers engendrent T on en déduit l'inégalité de la distributivité complète.

(2) \Rightarrow (3) cf. LAWSON[3], theorem 6 .

(3) \Rightarrow (4) clair .

(4) \Rightarrow (5) "

(5) \Rightarrow (6) "

(6) \Rightarrow (1) cf. HOFMAN-LAWSON[2], proposition 2.7.

Corollaire (PUDLÁK-TUMA [5]) : Dans un treillis algébrique T les conditions suivantes sont équivalentes

(1) T est complètement distributif

(2) Tout élément compact de T est supremum d'un nombre fini d'éléments copremiers.

Remarque: La notion de "bicontinuité" a été définie par Mislove 4 de la manière suivante : T et T^{op} sont continus et les topologies de Lawson , respectives , coincident. Mais si T est distributif , la continuité de T et T^{op} implique que les deux topologies sont identiques (Mislove) .

Références :

1. G. Gierz ,K. Keimel : A lemma on primes appearing in algebra and analysis . Houston J. Math. ,vol. 3, 2(1977) 207-224 .
2. K.H. Hofman ,J.D. Lawson : Irreducibility and generation in continuous lattices . Semigroup Forum vol.13(1977) 307-353.
3. J. D. Lawson :Intrinsic topologies in topological lattices and semilattices . Pacific J. Math. vol. 44(1973) 2 593-602.
4. M. Mislove, manuscrit non titré .
5. P. Pudlák , J. Tůma : Yeast graphs and fermentation of algebraic lattices ,Coll. Math. Lattice theory , 1976 301-343.